

الأخطار المحتمل حدوثها والمضاعفات لعملية الإجهاض:

هناك أخطار قد تحدث مع كل عملية جراحية بما في ذلك الإجهاض. لكي ما تكونين على دراية كاملة بخصوص قراراتك فإنه من المهم أن تكوني ملمة بأي أخطار أو مضاعفات قد تحدث. مع العلم بأن هناك إحتمال بوجود أخطار، فلا بد أن تعلمي بأن هذه المضاعفات لا تحدث كثيراً في العادة مع عملية الإجهاض. هناك العديد من الخبرات بخصوص أخطار عملية الإجهاض ومن المهم أن تعرفي أن القيام بعملية الإجهاض لن يؤثر على قدرتك بأن تحملي ويكون الحمل صحيحاً في المستقبل.

الحساسية:

من الممكن حدوث حساسية كرد فعل من الأدوية أو المواد المستخدمة في أثناء العملية مثل اللاتيكس البلاستيكيه.

الإجهاض الغير مكتمل وأيضاً يدعى الأنسجة المحتجزة:

في بعض الأحيان لا يتم إزالة لكل أنسجة الحمل هذا يحدث لأقل من 2 من كل 100 عملية إجهاض. لو حدث ترك جزء صغير من الأنسجة داخل الرحم يمكن أن يحدث نزيف أو تقلصات أو تلوث. ويمكن عن طريق جهاز الموجات فوق الصوتية ultrasound الكشف عن ما إذا كان هناك ما تزال أنسجة تركت بالداخل وعندها سيكون هناك الحاجة لعملية شفط لإزالة هذه الأنسجة.

العدوي:

من المحتمل حدوث عدوى بعد إجراء عملية إجهاض حيث أنه يمكن للبكتيريا أن تمر من المهبل إلى الرحم. وهذا يحدث لأقل من 2 لكل 100 عملية إجهاض. معظم حالات العدوى إذا تم اكتشافها مبكراً يمكن معالجتها بسهولة عن طريق المضادات الحيوية، إذا اتبعت المرأة الارشادات بعناية يمكنها أن تتجنب حدوث العدوى بسهولة.

النزيف الحاد:

النزيف الحاد يحدث لأقل من 1 لكل 1000 عملية إجهاض وعادة ما يحدث أثناء العملية أو مباشرة بعد عملية الإجهاض. إن الأطباء والمرضين مدربون على كيفية التحكم في هذا. إذا حدث هذا فمن الممكن أن تظلي لمدة أطول ليتم اعطاء الأدوية الوقت الكافي لكي تعمل على وقف النزيف. في حالات نادرة يتم نقل المريض للمستشفى لنقل الدم.

الإجهاض المنسي:

الإجهاض المنسي أو المُغفل لا ينهي الحمل ويستلزم إعادة عملية الإجهاض وهذا يحدث لأقل من 0.03% من كل الحالات. يحدث هذا غالباً مع النساء الذين عندهم شكل الرحم غير اعتيادي أو مقلوب في حدوث وجود البويضة الملقحة خارج الرحم. سوف يتم عمل إجراءات أخرى لإتمام عملية الإجهاض.

النزيف داخل الرحم:

النزيف يمكن أن يحدث داخل الرحم ويملاه بالدم وهو عادة ما يحدث في خلال 24 ساعة من إجراء العملية. ويحدث لأقل من 2 لكل 1000 عملية. والعلاج قد يحتاج لإجراء عملية أخرى.

إصابة للرحم ويطلق عليها أيضاً التثقيب:

أداة تستخدم أثناء العملية يمكنها أن تثقب (تثقب ثقباً) الرحم وتحدث لأقل من 1 لكل 1000 عملية وهذه يمكنها أن تلتئم من نفسها أو ربما تتطلب تدخلاً جراحياً ونادراً ما تتطلب إزالة الرحم.