مرجع سريع للإجهاض الجراحي

تشنج التشنجات يمكن أن تأتي وتذهب من 1 إلى 3 أسابيع ويمكن أن تكون شديدة قد تواجه نزيفا وتشنجا بعد الإجراء الخاص بك وهذا أمر طبيعي. تناول مسكنات الألم ، مثل إيبوبروفين و أسيتامينو فين ضع قربة تدفئة أو قارورة ماء ساخن أسفل نزيف كمية ضئيلة تدليك الرحم مفيد جدا أقل من 11 بوصة من الدم على فوطة ماكسى أو منديل عند مسحها اتصل بالعيادة إذا كانت لديك أسئلة في غضون ساعة واحدة نشاط كمية صغيرة • لا تقود السيارة لمدة 24 ساعة أقل من 4" " بوصات من الدم على • العودة إلى النشاط الطبيعي قدر التحمل بعد فوطة ماكسي في غضون ساعة 24 ساعة كمية معتدلة درجة الحرارة أقل من 6 بوصات من الدم على • استخدم مقیاس حرارة لقیاس درجة حرارتك الفوطة الصحية خلال ساعة واحدة • اتصل بالعيادة أو خط الطوارئ إذا كانت درجة حرارتك أعلى من 38 درجة مئوية كمية كبيرة تنظيم النسل فوطة ماكسي مشبعة بالدم • يمكن بدء جميع طرق تحديد النسل فور إجراء العملية خلال ساعة واحدة • يمكن رصع اللوب IUD وغرسة نكسبلانون Nexplanon في العيادة. اتصل بالعيادة أو اطلب الرعاية العاجلة درجة حرارة أعلى من 38 درجة مئوية تخدم القوط الصحية نزيف حاد: كمية كبيرة منه 3 فوط في ساعة واحدة أو فوطة اتصل بالعيادة إذا كان النزيف شديدًا: فقط وليس السدادات واحدة كل ساعة لمدة 3 ساعات كمية كبيرة على 3 فوط في ساعة واحدة أو القطنية أوأكواب فوطة واحدة كل ساعة لمدة 3 ساعات ديفاDIVA آلام شديدة في البطن لا تسكنها الأدوية

ساعات العيادة:

خط الطوارئ: 1780 940 1271 مساءً من الإثنين إلى الجمعة / 8:30 صباحًا - 4:30 مساءً

هاتف: 1124 484 780