
手术流产的快速参考

1

2

您做完手术后可能会出血和感到绞 痛,这是正常的。

出血



出血量微少

一小时之内擦拭时 在超大号卫生巾或 卫生纸上有少于1英 寸的血




出血量少

一小时之内在超大号 卫生巾上有少于4英 寸的血



出血量适中

一小时之内在超大号 卫生巾上有少于6英 寸的血



出血量多

一小时之内血浸透超 大号卫生巾





仅仅使用卫生 巾,请勿使用卫 生棉条或月经杯



如果出血量过多,请致电本诊所:

1小时内在3片卫生巾上有大量出 血或连续3小时每小时有1片卫生 巾上大量出血 绞痛



绞痛 会反复持续1—3周,有时会很严重



吃 止痛药,

比如布洛芬和扑热息痛



将 热敷垫 或 热水袋

放到小腹上




子宫按摩 非常有帮助



若有疑问 请致电本诊所

__ 活动





体温



如果您的体温高于38度, 请致电本诊所或拨打急救专线

节育措施



- 手术之后所有的节育方法都可以立即 开始
- 宫内节育器和植入式避孕棒都可以在本诊所放置

请给本诊所打电话或寻求紧急护理治疗

• 体温高于38度

出血量过多: 1小时内在3片卫生巾上有大量出血或连续3小时每小时有1片卫生巾上大量出血

• 药物无法缓解的剧烈腹痛



诊所工作时间:

周一至周五 上午8:30 — 下午4:30

电话: 780 484 1124

急救专线: 780 940 1271